



ZWALCZANIE WARROZY W PASIEKACH EKOLOGICZNYCH

Api-Bioxal
produkt leczniczy weterynaryjny
do stosowania w ulu



Api-Bioxal

roztwór do stosowania w ulu

Produkt leczniczy weterynaryjny
do zwalczania inwazji **Varroa**
destructor u pszczoł miodnych.



zawiera kwas szczawiowy dwuwodny

do stosowania w pasiekach ekologicznych

produkt gotowy do użycia

wysoka skuteczność przeciw warrozie

1 ml zawiera:

Substancja czynna:

* **kwas szczawiowy dwuwodny** 62,0 mg
(co odpowiada 44,2 mg kwasu
szczawiowego).

Substancje pomocnicze:

* **glicerol**

* woda oczyszczona

Api-Bioxal

- * innowacyjna postać farmaceutyczna gotowa do użycia
- * jednorazowe podanie
- * jedyny produkt zawierający glicerol
- * doskonała skuteczność i tolerancja
- * łatwe podanie produktu




Biowet
PUŁAWY

JAK STOSOWAĆ?

Dawkowanie i sposób podawania przez polewanie:

1. Leczenie polega na jednorazowym podaniu produktu.
2. Wymagana dawka to 5 ml na każdą uliczkę międzyramkową (odstęp pomiędzy górnymi listewkami ramek).
3. Produkt należy podawać za pomocą strzykawki wzdłuż każdej uliczki.
4. Maksymalna dawka wynosi 50 ml na ul.
5. Stosować maksymalnie dwa razy w roku (w porze letnio-jesiennej i/lub wiosennej).



Dosa-Laif

Wygodny dozownik wielokrotnego użytku o pojemności 600 ml do odmierzania i stosowania produktu **Api-Bioxal**
- większy niż typowa strzykawka
- łatwy pomiar objętości roztworu.
Dostępny w sprzedaży.



Zalecenia dla prawidłowego stosowania:

- należy stosować jednocześnie we wszystkich rodzinach danej pasieki, aby zapobiec reinwazji
- w przypadku izolacji matek, produkt stosować po 25 dniach od izolacji, gdy w rodzinach nie ma już czerwiu
- stosować bez nadstawek na miód
- podczas pracy z roztworem należy nosić ochronne rękawice i okulary, oraz jednorazową półmaskę (typ FFP2)

Api-Bioxal

roztwór do stosowania w ulu

Api-Bioxal Roztwór do stosowania w ulu ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH I INNYCH SUBSTANCJI

1 ml zawiera: Substancja czynna: kwas szczawiowy dwuwodny 62,0 mg (co odpowiada 44,2 mg kwasu szczawiowego).

Substancje pomocnicze: glicerol, woda oczyszczona.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do stosowania w ulu.

Klarowny, bezbarwny do jasnożółtego roztwór.

WSKAZANIA LECZNICZE Leczenie warrozy wywołanej przez *Varroa destructor* u pszczoł miodnych (*Apis mellifera*).

PRZECIWSKAZANIA Brak.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Leczenie może nieznacznie zakłócić spokój rodziny pszczelej; pszczoły mogą być pobudzone. Po zastosowaniu produktu może wystąpić zwiększona śmiertelność dorosłych pszczoł. W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulocie informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii. Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA W ulu. Produkt należy stosować w następujący sposób:

Dawkowanie i sposób podawania przez polewanie: Przed otwarciem opakowania bezpośredniego należy włożyć odpowiednią maskę ochronną, rękawice i okulary. Leczenie polega na jednorazowym podaniu produktu. Wymagana dawka to 5 ml na każdą uliczkę międzyramkową (odstęp pomiędzy górnymi listewkami ramek). Produkt należy podawać za pomocą strzykawki wzdłuż każdej uliczki. Maksymalna dawka wynosi 50 ml na ul. Stosować maksymalnie dwa razy w roku (w porze zimowej i/lub wiosenno-letniej).

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Zintegrowany program walki z warrozą: Skuteczność w poszczególnych rodzinach pszczelich może być różna ze względu na warunki stosowania (obecność czerwiu, temperatura, wtórna inwazja, itp.). Leczenie produktem powinno być stosowane jako jedna z metod zwalczania warrozy w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą, a osp roztoczy powinien być regularnie monitorowany. Nie należy stosować równocześnie z innymi akarycydami.

OKRES KARENCEJ Miód: Zero dni. Nie stosować w rodzinach z zapasami miodu, ani w czasie pożytku.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać oryginalne opakowanie szczelnie zamknięte w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać z dala od żywności. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie po upływie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: Skuteczność produktu jest znacznie obniżona w obecności czerwiu. Stosowanie produktu należy ograniczyć do rodzin bez czerwiu lub z małą jego ilością. Z tego względu, leczenie najlepiej przeprowadzać zimą lub kiedy matki pszczoły są izolowane. W przypadku leczenia w lecie, w rodzinach z izolowanymi matkami, najwyższą skuteczność osiąga się, jeśli okres izolacji trwa co najmniej 25-dni, a w rodzinach nie ma już czerwiu. Odpowiednią skuteczność można uzyskać w przypadku niewielkiej lub średniej inwazji *Varroa destructor*. Silnie porażone rodziny mogą zginąć z powodu inwazji roztoczy *Varroa destructor*, pomimo prawidłowego użycia produktu. Zaleca się stosowanie produktu w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą i regularne monitorowanie osypu roztoczy.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Powtarzanie leczenia może spowodować silne pobudzenie rodziny pszczelej. Wszystkie rodziny w tej samej pasiece należy leczyć równocześnie, aby nie dopuścić do ponownej inwazji. Nie należy zakłócać spokoju w ulach w ciągu kilku dni po leczeniu. W trakcie leczenia należy uważać, aby pozostałości produktu nie osiadły na ramkach, które nadal będą używane do produkcji miodu w danym sezonie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Roztwór ma odczyn kwaśny i może powodować poważne podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania produktu. Podczas pracy z roztworem (zarówno w fazie leczenia, jak i przed leczeniem) należy nosić jednorazową półmaskę oddechową zgodną z Normą Europejską EN149 (typ FFP2), rękawice odporne na działanie kwasów i okulary ochronne. Po podaniu produktu, należy umyć wodą z mydłem ręce oraz materiał, który miał kontakt z produktem. W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku dostania się produktu do oczu, należy dokładnie przemyć oczy dużą ilością czystej, bieżącej wody oraz skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać. W przypadku niezamierzonej inhalacji, umożliwić oddychanie świeżym powietrzem. W razie trudności z oddychaniem, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi etykietę produktu. W przypadku spożycia nie należy wywoływać wymiotów, lecz skontaktować się z lekarzem i okazać niniejsze ostrzeżenie. Podczas pracy z produktem nie należy jeść, pić ani palić.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Nie należy stosować równocześnie z innymi akarycydami.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzieleniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): W ulach, w których zastosowano potrójne dawki produktu (przez nakrapianie), zaobserwowano znacznie wyższą śmiertelność pszczoł. Ponadto przedawkowanie może powodować obniżenie żelodności rodziny pszczelej do zimowania, utratę matek pszczelich oraz może mieć wpływ na rozwój rodziny wiosną.

Główne niezgodności farmaceutyczne: Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nieużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów: Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Api-Bioxal nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Inne informacje: Butelka o pojemności 500 ml, pojemnik 5 l, pojemnik 5 l bag-in-box. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego: Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy, Polska, tel.: +48 81 888 91 00

WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT. WYDANY Z PRZEPISU LEKARZA -RP. DO PODAWANIA POD NADZOREM LEKARZA WETERYNARI.

OKRES WAŻNOŚCI: 3 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 3 miesiące.

Pozwolenie nr 3092/21

Podmiot odpowiedzialny: CHEMICALS LAIF S.p.A., Viale dell'Artigianato 13, 35010 Vigonza (PD), Włochy

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: CHEMIFARMA S.p.A., Via Don Eugenio Servadei 16, 47100 Forlì (FC), Włochy



Data opracowania: lipiec 2021 r.